



SAN ISIDRO[®]
INSTITUTO UNIVERSITARIO

Instituto Superior tecnológico Universitario
San Isidro.

Carrera: Técnico en Enfermería

Asignatura: Gineco - obstetricia

Tema: Glosario


Estudiante: Evelyn Karina Morecho Pillacela

Docente: lk. Karla Pante Balarezo.

Ciclo y Paralelo : Cuarto "B"

Fecha:



Endometritis: inflamación o irritación del revestimiento del útero (el endometrio). No se considera lo mismo que endometrosis.



Corioamnionitis: Es una infección de la placenta y el líquido Amniótico, la causa más común es en el parto y nacimiento prematuro o cuando el saco amniótico ha estado roto por mucho tiempo antes del nacimiento. Síntoma principal fiebre.

✓


Amniocentesis: Prueba realizada durante el embarazo para diagnosticar ciertos trastornos genéticos, defectos congénitos y otros problemas de salud en un feto.



Hidramnios: Afección que ocurre cuando se acumula mucho líquido amniótico durante el embarazo también se lo conoce como trastorno del líquido amniótico o polihidramnios.

✓


Necrosis histica: Muerte del tejido corporal, ocede cuando muy poco sangre fluye al tejido, esto puede suceder por lesión, radiación o sustancias químicas.



Polipos: Crecimiento de tejido anormal en una membrana mucosa, que sobresale del tejido de la pared de un espacio hueco, como el intestino.



✓

Metritis: Inflamación del útero normalmente debido a una infección microbiana que se produce durante los 21 días (normalmente 10) posteriores al parto anormal o una retención placentaria.



Parametritis: Es un tipo de enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) caracterizada por inflamación de parametrio es decir, del conjunto de estructuras que enlazan el útero con la pelvis.


Sepicemia fetal: infección en la sangre, presentada en un bebé de menos de 90 días de edad la Sepsis temprana se ve en la primera Semana , y la tardía desde la primera hasta la tercera Semana.



Adenomiosis: Afección caracterizada por la presencia y crecimiento del tejido endometrial en la pared del útero, la adenomiosis suele aparecer en los últimos años de fertilidad y generalmente desaparece con la menopausa.




Taponmias: Pérdida breve del conocimiento debido a una disminución del flujo sanguíneo del cerebro, lo que provoca pérdida del conocimiento de manera completa o parcial.




Embarazo molar: tumor benigno que se desarrolla en el útero a causa de un embarazo no viable , Es posible que haya o no un embrión o tejido placentario presente , si hay un embrión no sobrevive.

Conocarcinoma: tumor Maligno de crecimiento rápido , que se origina en las células trofo blásticas (células que ayudan a que el embrión se adhiera al útero y se forme la placenta.



Alopecia: Caída del cabello en el cuero cabelludo o en cualquier otra parte del cuerpo , que puede ser a causa de una dieta baja en nutrientes esenciales , problema de tiroides , déficit de hierro o infecciones.


Estomatitis: Afección que provoca hinchazón y llagas que causen dolor dentro de la boca , puede deberse a una enfermedad , infección , reacción alérgica , a alimentos o productos químicos que generen irritación.



Hipertonía: hipertensión muscular que se produce cuando la comunicación entre el cerebro y la médula espinal se ve afectada por lesiones o enfermedades

✓



Polisistolia: Contracciones uterinas > 5 en 10 minutos , no permite al feto recuperar su estado de oxígeno normal , de modo que el descenso de SaO₂F es aún más marcado.



Amniotomía: Método para inducir el parto mediante la rotura deliberada del amnios para provocar la liberación de líquido amniótico.

✓

hematócrito: Cantidad de sangre total compuesta de globulos rojos, dependiendo de la cantidad y tamaño de los glóbulos rojos el hematocrito es un recuento sanguíneo completo. (RSC). ✓



Thrombofilia: Anomalía de los mecanismos normales de coagulación de la sangre. Esto aumenta la probabilidad de que los vasos sanguíneos se coagulen (trombosis) en cualquier parte. (art y ve) ✓




Petechias: Puntos redondos y pequeños de color púrpura o marrón debido al sangrado debajo de la piel. Puede darse en un área pequeña, debido a un traumatismo menor o generalizado. Debido a la coagulación de la sangre. ✓



Trombocitopenia: Cantidad baja de plaquetas en la sangre, esto puede ser a causa de un embarazo, la altitud o efectos secundarios de medicamentos. ✓





Heparina: Es un fármaco Anticoagulante utilizado principalmente para prevenir y tratar la trombosis venosa. ✓





Menorragia: Sangrado menstrual abundante o prolongado con el ciclo menstrual, puede darse a causa de, desequilibrio hormonal, el uso de DIU o efectos secundarios a medicamentos. ✓

quimiocinas: papel importante en la respuesta inmunitaria, estimulan el movimiento de ciertos tipos de glóbulos blancos y los atraen a las áreas de inflamación para ayudar al cuerpo a combatir infeciones, afecciones inflamatorias y otras enfermedades




Miomatosis: Aparición de miomas uterinos, tumores benignos que se desarrollan en el útero apartir de su músculo liso: el miometrio.

rhabdomiosarcoma: Es un hpo de sarcoma, cáncer de tejido blando (por ejemplo, músculo, tejido conjuntivo (tendón y cartílago) o hueso, suele cometer en los músculos que se unen a los huesos y que ayudan a mover al cuerpo.





hemofilia: trastorno que provoca que la sangre no coagule normalmente, produciendo sangrado excesivo (interno y externo) después de una herida o lesión.

Dyspareunia: Dolor en las relaciones sexuales, dolor genital persistente o recurrente que se produce justo antes, durante o después del coito.





Uveitis: llamado también Ureitis, inflamación de la capa media del ojo (cúvea), el hpo más común es la inflamación del iris (llamada Iris Uveitis anterior)

Metrorragia: Sangrado del útero que se produce entre períodos, puede ocurrir cada un par de semanas y el flujo puede ser más intenso de lo normal.




Hipermenorrea: Sangrado vaginal intenso o prolongado con el ciclo menstrual, es una alteración en la cantidad de sangre.

Menometrorragia: Es un Sangrado de intensidad y duración aumentado, con intervalos irregulares aunque deben tenerse en cuenta que esta nomenclatura no es universalmente admitida.



Poli-menorrea: Periodos menstruales frecuentes que se presentan con menos de 21 días entre uno y otro.

Leiomioma uterino: Mioma uterino. Se considera una Neoplasia benigna del útero que suele aparecer durante los años de fertilidad. Se desconoce la causa de los miomas, los factores de riesgo son los antecedentes familiares de fibromas, la obesidad y pubertad temprana.



Iatrogenia: Es un daño no deseado, ni buscado en la salud, causado por un efecto secundario ocasionado por un profesional de salud a pacientes, familias u otras personas de manera no intencional.

Borramiento fetal: Cuando el cuello del útero se expande (se dilata) y se adelgaza (borramiento) para permitir que el bebé se mueva hacia el canal de parto.




Multiparidad: Corresponde a aquella mujer en la que se encuentra en una condición por la cual la gestante ha tenido 2⁺ hijos o mas partos.

31

Síndrome Frimel: Afección ginecológica poco frecuente que se caracteriza por la persistencia de la secreción de leche materna (galactoreal) y la ausencia de menstruación (amenorrea) en el período postparto, más allá de los tiempos normales de lactancia y recuperación.


32



Vulvovaginitis: inflamación de la vagina que puede ocasional secretiones, picazón y dolor. La vaginitis generalmente ocasionada por un cambio en el equilibrio normal de bacterias vaginales.

33

Peritonitis: inflamación de la membrana que reviste la pared abdominal y recubre los órganos abdominales; generalmente es infecciosa y puede ser mortal, ocasionada por filtración o un anticuio en los intestinos.



Osteocondritis: articulación muere debido a la falta de flujo sanguíneo dificultando Moviimiento

34